Lupan®

USO PROCTOLÓGICO

GLICÉRIDOS MIXTOS DE ÁCIDO OLEICO, LINOLEICO, PALMÍTICO Y ESTEÁRICO. VITAMINAS A Y D

Rápido y efectivo control de las lesiones anorrectales más frecuentes

- Proctitis
- Papilitis
- Procesos hemorroidales
- Fisuras anales
- Úlceras anales y perianales
- Post cirugía proctológica

La **vitamina A** favorece el desarrollo de los tejidos epiteliales. La **vitamina D**, en forma de aceites minerales, tiene acción local como revitalizador epitelial.

Los **ácidos grasos instaurados** forman parte de la capa córnea dérmica y favorecen la penetración de las vitaminas, ya que son intensificadores de la permeabilidad.

Lupan®

USO PROCTOLÓGICO

Rápido y efectivo control de las lesiones anorrectales más frecuentes

Presentación exclusiva
con aplicador monodosis descartable

POSOLOGÍA Y MODO DE USO
1 ó 2 veces por día de acuerdo a la patología y al criterio médico. Se preferirá su administración luego de las deposiciones y antes de acostarse por la noche.

INSTRUCCIONES PARA SU EMPLEO
Retire el "capuchón coloreado" del **AMD (aplicador monodosis descartable)**.
En el extremo opuesto, encastre el vástago en el "émbolo impulsor coloreado".
Coloque manualmente suficiente pomada en la región anal para que cumpla su objetivo terapéutico. Luego de esto, introduzca la parte más fina del **AMD** e inyecte su contenido profundamente en el recto.
Proceda en cada aplicación de la misma manera.
Conserve limpio el vástago para la próxima aplicación.

Lupan®
USO PROCTOLÓGICO

Envases con 10 aplicadores monodosis descartables con 5 g de pomada cada uno.



OTRA PRESENTACIÓN:

Lupan®
USO DÉRMICO

Pomo con 50 g.



Composición: Cada 100 g contiene: Glicéridos mixtos de ácido oleico, linoleico, palmítico y esteárico 52 g; Vitamina A y D en glicéridos de ácidos palmítico y esteárico (equiv. A 10.00 UI Vit. A y 100 UI Vit. D) 10 g; triglicéridos de ácidos grasos ricinoleico y oleico 3 g; elementos no grasos de aceite vegetales 12 g; ácido esteárico 2 g; cera amarilla 10 g; esencia herbal 980 mg; butilhidroxitolueno 20 mg; vaselina líquida 10 g. **Acción Terapéutica:** Antiinflamatorio, protector, reepitelizante y emoliente tópico. **Indicaciones:** Heridas no sobreinfectadas. Quemaduras leves de la piel. Úlceras de miembros. Escaras de decúbito. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. **Reacciones Adversas:** La vitamina A puede absorberse a través de la piel pudiendo provocar toxicidad especialmente en niños; en los mas pequeños puede producirse un aumento de la presión intracraneal, papiledema, tinnitus y trastornos visuales que remiten con la suspensión del tratamiento.

DESCUENTO PAMI

Recetario Solidario

MPN MEDICAMENTOS DE PRIMER NIVEL

LABORATORIO FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
www.finadiet.com.ar

FINADIET