

## INFORMACIÓN PARA PACIENTES

### FINALIT CITRATO DE POTASIO 3 g

Polvero para solución oral - administración vía oral  
VENTA BAJO RECETA

#### FÓRMULA:

Cada sobre contiene: citrato de potasio 3 g.  
Excipientes: dióxido de silicio coloidal; aspartamo; sacarina  
sódica; sabor frutilla; fosfato tribásico de calcio.

#### GENERALIDADES:

**Lea este instructivo detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

Conserve este prospecto, ya que podría volver a necesitarlo. Si de la lectura surgiera alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe ofrecerlo a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, ya que puede resultar perjudicial.

Si considera que ha comenzado a sufrir alguno de los efectos adversos que se detallan más adelante o alguno no mencionado en este prospecto, informe a su médico y/o farmacéutico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### ¿QUÉ ES FINALIT Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Finalit pertenece al grupo de medicamentos denominados solventes de concreciones urinarias que sirven para disolver los cálculos (piedras) del aparato urinario.

Finalit reduce la formación de cristales de oxalato cálcico y la precipitación del ácido úrico. Aumenta el pH de la orina procurando restablecer sus niveles normales sin provocar ninguna alteración en el organismo.

Está indicado en el tratamiento de diversos trastornos del riñón, tales como litiasis renal (formación de cálculos o piedras en el riñón), hipocitraturia (disminución de citratos en la orina), acidosis tubular con nefrolitiasis cálcica.

#### ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO:

**No tome FINALIT si usted padece:**

- Insuficiencia renal, infección urinaria, obstrucción en el sistema urinario (bloqueo que interrumpe el paso de la orina).
- Hiperpotasemia (aumento de los valores de potasio en sangre), hipocalcemia (niveles bajos de calcio en sangre).
- Insuficiencia suprarrenal (la glándula suprarrenal regula la

respuesta al estrés y aporta al circuito hormonal).

- Úlcera péptica activa (úlceras de estómago o de duodeno), hipoclorhidria (escasa producción de ácido estomacal), obstrucción en el intestino (impide el paso de su contenido).
- Enfermedad cardíaca que pueda agravarse con la ingesta de potasio.
- Alcalosis respiratoria (disminución del dióxido de carbono en sangre), alcalosis metabólica (aumento del bicarbonato en sangre).
- Si consume algún medicamento con efecto anticolinérgico.

En todos los casos consulte a su médico y eventualmente a su farmacéutico, quienes podrán asesorarlo.

#### USO APROPIADO DEL MEDICAMENTO:

Siga exactamente las instrucciones de administración de Finalit indicadas por su médico.

#### ¿Cómo y en qué momento debo tomar FINALIT?

Finalit debe tomarse diluyendo el contenido del sobre en un vaso de agua o jugo cítrico, preferentemente con las comidas.

#### ¿Qué dosis debo tomar?

Su médico determinará cuál de las siguientes dosis de Finalit es la más conveniente para su caso:

- Iniciar el tratamiento con 2 sobres de Finalit por día.
- Iniciar el tratamiento con 1 sobre por día. Su médico podría decidir incrementar la dosis con el tiempo.

#### POSIBLES REACCIONES ADVERSAS:

Durante el tratamiento pueden presentarse eventos adversos vinculados al uso de la medicación, al igual que todos los medicamentos. Ante la aparición de los mismos consulte a su médico.

Algunos de los posibles efectos adversos podrían ser:

Trastornos gastrointestinales leves, tales como disconfort abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que pueden reducirse mediante la administración conjunta de alimentos.

#### PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TIEMPO QUE SE UTILIZA EL MEDICAMENTO:

Es recomendable que durante el tratamiento con Finalit siga un régimen sin sal y aumente la ingesta de líquidos. Cada 4 meses de tratamiento con Finalit es aconsejable la realización de controles, tales como medición de electrolitos plasmáticos, creatinina y hemograma, que podrían ser indicados por su médico.

#### Uso de otros medicamentos

Comuníquese a su médico qué otros medicamentos está usted tomando, ha tomado recientemente o podría necesitar tomar, ya que Finalit podría modificar la acción de otras drogas.

#### Embarazo y lactancia

Consulte a su médico si usted está embarazada, si cree que podría estarlo, si tiene intención de quedar embarazada o si está amamantando, ya que en estos casos es necesario un estricto control médico.

#### Niños

FINALIT no debe ser administrado en niños.

#### SOBREDOSIFICACIÓN:

Si toma más cantidad de Finalit de la indicada, acérquese al hospital más cercano o comuníquese a los Centros de Toxicología:  
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115.

Hospital de Pediatría Sor María Ludovica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555

**Optativamente a otros centros de intoxicaciones.**

#### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar seco, preferentemente entre 15°C y 30°C, en su envase original.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

No utilizar el medicamento si el envase está dañado.

#### PRESENTACIÓN:

Envases con 60 sobres.

#### Comunicación de sospechas de reacciones adversas

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. **Informar cualquier sospecha de eventos adversos a FINADIET S.A.C.I.F.I. al teléfono (011) 4981-5444/4981-5544 o en la página [www.finadiet.com.ar](http://www.finadiet.com.ar).**

**También alternativamente puede comunicarlos directamente al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, a través de la página ANMAT.**

**<http://rea.anmat.gob.ar/Home>  
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234**

Especialidad Medicinal autorizada por Ministerio de Salud.

Certificado N° 57.891

Dirección Técnica: Diego F. Saubermann, Farmacéutico.

Fecha última revisión: Disposición ANMAT N° 3429/2016.